

Влияние эрозионно-карстовых процессов на литологическую характеристику продуктивных пластов бобриковско-турнейского нефтесодержащего резервуара

P.P. Харитонов¹, Ю.М. Арефьев²

¹ОАО «Татнефтепром-Зюзевнефть, Мамыково, Россия

²Институт проблем экологии и недропользования Академии наук Республики Татарстан, Казань, Россия

Эрозионно-карстовые процессы на поверхности турнейской суши, образовавшейся вследствие регрессии девонско-турнейского моря, привели как к значительной морфологической переработке турнейского палеорельефа, так и к формированию в условиях позднерадаевско-бобриковской трансгрессии песчаных линз с вторичным глинисто-карбонатным цементом при преобладании карбонатной составляющей. На примере двух соседних скважин показано, что песчаники с обильным глинисто-карбонатным цементом при интерпретации ГИС могут приниматься за карбонатные породы-коллектора, если не учитывать значения таких факторов, как повышенное содержание кальция в морской воде радаевско-бобриковского бассейна и углекислоты в атмосфере нижнекаменноугольного времени, которые обусловили развитие карбонатного цемента у визейских песчаников и вторичную кальцитизацию турнейских пород.

Ключевые слова: эрозионно-карстовые процессы, врез, пласты-коллекторы, нефтенасыщенность, корреляция разрезов, глинисто-карбонатный цемент, карбонатные и терригенные породы.

DOI: 10.18599/grs.18.2.3

Для цитирования: Харитонов Р.Р., Арефьев Ю.М. Влияние эрозионно-карстовых процессов на литологическую характеристику продуктивных пластов бобриковско-турнейского нефтесодержащего резервуара. *Георесурсы*. 2016. Т. 18. № 2. С. 94-97. DOI: 10.18599/grs.18.2.3

Карстовые процессы в настоящее время широко распространены на той части земной поверхности, которая сложена карстующимися породами – известняками, доломитами, гипсами (Гвоздецкий, 1954). Результатами этих процессов являются весьма своеобразные формы рельефа, которые можно наблюдать в разных географических и климатических поясах (Испания, Австрия, Крым, Китай, Австралия и др.).

Не менее широкое распространение эти коррозионные процессы имели в прошедшие геологические эпохи. Недооценка их роли в создании как скульптурных форм палеорельефа, так и пустотного пространства карстующихся пород может привести к ошибочным практическим последствиям. Примером тому является сопоставление нижнекаменноугольных разрезов двух скважин (№№ 2345 и 2507) на Зюзевском месторождении. Скважины располагаются в 300 м друг от друга в центральной части брахиантиклинального поднятия III порядка по кровле тульского горизонта, которое контролирует залежи нефти в карбонатных по составу породах-коллекторах турнейского яруса и в терригенных породах (песчаниках, алевролитах) визейского яруса, а также в среднекаменноугольных интервалах разреза – в башкирских и верейских отложениях.

Современные формы турнейской поверхности Зюзевского поднятия, по нашему мнению, были созданы в результате эрозионно-карстовых процессов, протекавших на турнейской суше в елховско-раннерадаевское время. Денудационно-коррозионные процессы оказали также значительное, хотя и опосредованное влияние на характер радаевско-бобриковских терригенных пород, заполнивших посттурнейские «врезы» на поднятии, и тульских пород, перекрывших радаевско-бобриковскую толщу. Без учета этого фактора интерпретация разрезов соседних скважин по ГИС может оказаться весьма различной как по стратиг-

рафическому, так и по литологическому содержанию, а также по характеру насыщенности пород-коллекторов.

По заключению ГИС в скважинах №№ 2345 и 2507 кровля тульского горизонта отбивается на близких абсолютных отметках – 1150,5 и 1156,2 м, соответственно (Рис. 1). Скважина № 2345 вскрыла визейский врез: радаевско-бобриковские терригенные породы в ее разрезе залегают на размытой поверхности заволжского горизонта фаменского яруса верхнего девона, т.е. турнейские отложения в районе скважины денудированы в полном объеме. Толщина визейского комплекса пород – 78,6 м. В скважине выделены нефтенасыщенные пласты-коллекторы: тульский Стл-4 в кровле горизонта, Сбр-3, Сбр-2, сливающийся с пластом Сбр-1, и во врезе – серия линз песчаников, объединяемых в пласт Сбр-1. Пласты-коллекторы подстилаются и перекрываются пачками аргиллитов толщиной 2,5–15 м.

В скважине № 2507 кровля турнейских отложений в заключении ГИС проведена на глубине 1331,2 м (абсолютная отметка – 1199 м) по «традиционному» признаку: снижению значений ГК и повышению значений НГК на границе «глинистые породы-известняки» и показаниям кавернограммы на этом уровне. Однако в скважине пачки глинистых пород прослеживаются ниже по разрезу в интервалах 1350,4–1354,4 м, 1362,6–1365,2 м, 1367,4–1371,2 м, т.е. в составе турнейских отложений. Выделенные между ними карбонатные прослои имеют пористость 23–23,8 %, 16,7–20 %, в интервале 1365,2–1367,4 м – 8,1 %. Удельное сопротивление пласта для этих интервалов составляет 8–16,8 Омм. По показателям пористости – это высокопористые породы-коллекторы, по значениям удельного сопротивления – породы водонасыщенные.

Из подобной интерпретации ГИС двух соседних скважин следует, что в скважине №2345 подошва общего нефтенасыщенного интервала находится на абсолютной от-

метке – 1224,4 м, тогда как кровля водонасыщенного в скважине № 2507 отбивается на абсолютной отметке – 1199 м, т.е. на 25 м выше.

Сопоставление каротажных диаграмм скважин позволяет заключить, что разрезы их достаточно хорошо коррелируются между собой. В скважине № 2507 все пласти-коллекторы между пачками глинистых пород являются не карбонатными породами, а песчаниками на глинисто-карбонатном цементе, с преобладанием карбонатной составляющей над глинистой. Скважина № 2507 вскрыла тот же

самый визейский «врез», который был выявлен скважиной № 2345. Толщина визейских отложений 84,2 м. Радаевско-бобриковская терригенная толща во врезе залегает на размытой поверхности уплотненных известняков заволжского горизонта фаменского яруса верхнего девона. Как и в скважине № 2345, турнейские отложения в скважине № 2507 размыты полностью (Рис. 2).

Значения удельного сопротивления пласта (8-12 Омм) пород-коллекторов в общем интервале 1199-1229 м абсолютной высоты для карбонатных коллекторов означают их




Рис. 1. Схема сопоставления нижнекаменноугольных отложений по скважинам №№ 2345, 2507. Масштаб вертикальный 1:500.




Рис. 2. Фрагмент схематического геологического профиля продуктивных нижнекаменноугольных отложений. Масштаб горизонтальный 1:10000, вертикальный 1:500.

водонасыщенность, либо – при значениях 12–15 Омм – остаточную или слабую нефтенасыщенность, тогда как для песчаников это показатель нефтенасыщенности при прочих равных условиях.

Таким образом, в разрезе скважины № 2507 в терригенной визейской толще выделяются пласти-коллекторы Стр-4, Сбр-3, Сбр-2 и серия пластов Сбр-1, нефтенасыщенных как и в соседних скважинах по профилю (Рис. 2).

О глинисто-карбонатном характере цемента песчаников в разрезе скважины № 2507 косвенно свидетельствуют также относительно невысокие значения коэффициента проницаемости по ГИС – 5,7–91,9 мкм². Карбонатная составляющая цемента песчаников является вторичной по отношению к сформировавшимся ранее песчаным линзам. Пласти-коллекторы Сбр-1, частично Сбр-2, переслаивающиеся с аргиллитами и заполняющие «врезы», осаждались в относительно мелководных морских условиях, установившихся в пониженных участках материковой суши в результате первого цикла трансгрессии позднерадаевско-бобриковского моря. Воды этого моря содержали значительное количество растворенных соединений кальция, поступавших в них с размываемой и карстующейся турнейской суши, как и воды бобриковско-тульского морского бассейна, перекрывшего уже всю поверхность востока Русской платформы в ходе следующего цикла морской трансгрессии.

Кроме того, поступавшие в морской бассейн атмосферные воды содержали значительное количество углекислоты, а частые и обильные ливни смывали с поверхности турнейской суши – до перекрытия ее бобриковско-тульской трансгрессией – продукты ее разрушения – своего рода кору выветривания в карстовые долины и углубления. Все это придало своеобразный литолого-фаунистический облик визейской терригенной толще, особенно во «врезах». Кора выветривания – нерастворимый остаток, обломки коренной породы-известняка («труха»), сцементированные осаждавшейся глинистой илисткой массой, отмечается на поверхности турнейских отложений в ряде скважин (№№ 942, 2363, 2344 и др.). В скважине № 2507 в интервалах 1365,4–1367,4 м и 1370,4–1372 м залегают обвалевые обломки известняка с характерными для него значениями коэффициента пористости (8,1–8,3 %), которые подстилаются и перекрываются пачками аргиллитов. Аналогичные интервалы отмечаются в разрезах других скважин (№ 2511).

Построение геологической модели залежей на таком поднятии, как Зюзевское, осложненного разнонаправленными и разной глубины «врезами» с линзами песчаников в визейской толще, должно основываться на корреляции разрезов соседних скважин, которая, в свою очередь, должна учитывать влияние эрозионно-карстовых процессов на показатели фильтрационно-емкостных свойств как визейских песчаников, так и сохранившихся от денудации турнейских пород, а также на данных опробования скважин.

Таким образом, формирование современного турнейского рельефа происходило в условиях регрессии турнейского морского бассейна и последовавшего косьвинско-раннерадаевского перерыва в осадконакоплении, установленного на Русской платформе (Иголкина и др., 1977). Этот рельеф создавался под действием эрозионно-карстовых процессов. Позднерадаевско-бобриковский и тульский циклы морской трансгрессии привели к восстановлению морской обстановки и отложению толщи терригенных пород – визейских аргиллитов и песчаников. Особенности физико-химического состава морских вод, обусловленные литологией разрушающей дневной поверхности, вызвали вторичную кальцитизацию и глинитацию как визейских песчаников, так и карбонатных пород турнейского возраста.

Литература

Гвоздецкий Н.А. Карст. М: Географгиз. 1954. 351 с.
Иголкина Н.С., Кривская Т.Ю. Довизейский перерыв на Русской платформе. Советская геология. 1977. № 7. С. 71–78.

Сведения об авторах

Руслан Радикович Харитонов – главный геолог
ОАО «Татнефтепром-Зюзевнефть». Россия, 423024,
Республика Татарстан, Нурлатский район, с. Мамыково
Тел: +7(84345) 4-14-15, e-mail: zuzeev@gmail.com

Юрий Михайлович Арефьев – старший научный сотрудник Института проблем экологии и недропользования Академии наук Республики Татарстан

Россия, 420087, Казань, ул. Даурская, д. 28

Статья поступила в редакцию 05.02.2016

Influence of Erosion-karst Processes on Lithological Features of Productive Strata in Bobrikovian-Tournasian Oil Reservoir

R.R. Kharitonov¹, Yu.M. Aref'ev²

¹JSC «Tatnefteprom-Zyuzeyevneft», Mamykovo, Russia

²Institute for problems of ecology and subsoil use of Tatarstan Academy of Sciences, Kazan, Russia

Abstract. Erosion-karst processes on the surface of Tournaisian land, formed as a result of regression of Devonian-Tournaisian Sea, led to both significant morphological transformation of Tournaisian paleorelief and formation in the Late Radaevskian-Bobrikovian transgression of sand lenses with secondary clay-carbonate cement with a predominance of carbonate component. On the example of two adjacent wells it is shown that sandstones with abundant clay-carbonate cement during logging interpretation may be taken for carbonate reservoir rocks, if factors are not taken into account such as increased calcium in seawater of Radaevskian-Bobrikovian basin and carbon dioxide in the atmosphere of Lower Carboniferous. They led to the development of carbonate cement in Visean sandstone and secondary calcification in Tournaisian rocks.

Keywords: erosion-karst processes, incision, reservoir, oil saturation, correlation of sections, clay-carbonate cement, carbonate and clastic rocks.

References

Gvozdetskiy N.A. Karst. Moscow: Geografgiz Publ. 1954. 351 p.
(In Russ.)

Igolkina N.S., Krivskaya T.Yu. Dovizeyskiy pereryv na Russkoy platforme [Dovizeysky break on the Russian platform]. Sovetskaya geologiya = Soviet Geology. 1977. No. 7. Pp. 71-78. (In Russ.)

For citation: Kharitonov R.R., Aref'ev Yu.M. Influence of Erosion-karst Processes on Lithological Features of Productive Strata in Bobrikovian-tournasian Oil Reservoir. *Georesursy = Georesources*. 2016. V. 18. No. 2. Pp. 94-97. DOI: 10.18599/grs.18.2.3

Information about authors

Ruslan R. Kharitonov – Chief Geologist

JSC «Tatnefteprom-Zyuzeyevneft». Russia, 423024, Tatarstan Republic, Nurlatsky district, Mamykovo village
Phone: +7(84345) 4-14-15, e-mail: zuzeev@gmail.com

Yuriy M. Aref'ev – Senior Researcher

Institute for problems of ecology and subsoil use of Tatarstan Academy of Sciences. Russia, 420087, Kazan, Daurskaya str, 28

Manuscript received February 05, 2016